

51Methotrexate 使用說明

滅殺除炎 Methotrexate 的使用說明

一、Methotrexate (中文名：滅殺除炎、MTX) 2.5mg/tab

MTX 在高劑量下是抗白血病的化學藥物，而一般用於治療皮膚疾病時劑量相當低，作用為免疫調節劑，副作用也較高劑量輕微許多。目前常用於皮膚病的治療為：**乾癬、異位性皮膚炎、嚴重濕疹、圓禿、蕁狀肉芽腫、皮膚 T 細胞淋巴瘤、自體免疫疾病等。**

二、禁忌症：

- 曾對 Methotrexate 藥物的成分有過敏反應者。
- 懷孕：研究報告建議懷孕應在停藥三個月至一年後較無風險。
- 正在哺乳者。
- 嚴重肝腎功能不全。

罹患乾癬或風濕性關節炎病人如有以下情況不得使用本藥：

- 酒精中毒之病人、酒精性肝病病人或其它慢性肝病
- 檢驗數據顯示有免疫不全的病人
- 曾罹患血液病變，如骨髓發育不全、白血病、血小板缺乏症或顯著貧血

三、使用方式

- 為減輕副作用(噁心、肝功能異常、血球降低等)，需搭配服用**自費葉酸(Folic acid)**，一般在最後一劑 MTX 服用後的**12 小時**服用！(請務必服用)
- 服藥期間，**禁喝酒、禁用阿斯匹靈、Baktar、probenecid 或消炎止痛藥**，如需使用，請與醫師討論。

四、如果忘記使用怎麼辦？

仍間隔十二小時服用。如果已經接近下週服藥時間，則跳過一次，依原來時間服用下一次的劑量，**絕不可**一次服用兩倍藥量。

五、副作用

常見副作用為噁心、腸胃不適。若發現身上多處**破皮、嘴巴潰瘍及乾癬病灶疼痛**，請停藥並立即回皮膚科門診！